



## Jackson County Department of Public Health

Anna Lippard  
Deputy Health Director  
828-587-8225

2022-03  
FOR IMMEDIATE RELEASE  
January 10, 2022

The FDA and the Centers for Disease Control and Prevention have shortened the interval recommended between the completion of a mRNA primary vaccination and use of a booster dose from 6 months to 5 months. The CDC recommends that individuals who received the Pfizer or Moderna COVID-19 vaccine get a booster dose after five months.

Current recommendation for COVID-19 boosters is:

- Those who received the Moderna or Pfizer vaccine should get a booster **five months after** their last dose.
- Those who received the Johnson & Johnson vaccine should get a booster **two months after** their initial dose.

Anyone ages 12 and older should receive a booster. Parental consent is required for those 12 to 17.

Adults may receive any brand of the COVID-19 vaccine for their booster, while children 12 to 17 can only receive Pfizer. The CDC recommends that mRNA vaccines made by Moderna and Pfizer are the best choice for most people for preventing severe illness and hospitalization from COVID-19. However, [NCDHHS](#) and the Jackson County Department of Public Health encourage individuals to speak with a doctor, nurse or pharmacist if they have questions about what booster is right for them.

Additionally, consistent with the CDC's previous recommendation for adults, CDC is recommending that moderately or severely immunocompromised 5–11-year-olds receive an additional primary dose of vaccine 28 days after their second shot. Currently, only the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine is authorized and recommended for children aged 5-11.

The Jackson County Department of Public Health offers COVID-19 vaccines (including booster doses) on Tuesdays, Thursdays, and Fridays. To schedule an appointment visit [vaccines.gov](https://www.vaccines.gov) or call 828-587-8289.

###



## Jackson County Department of Public Health

Anna Lippard  
Subdirectora de Salud  
828-587-8225

2022-03  
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
10 de Enero del 2022

La FDA y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han acortado el intervalo recomendado entre la finalización de una vacunación primaria de ARNm y el uso de una dosis de refuerzo de 6 meses a 5 meses. El CDC recomienda que las personas que recibieron la vacuna Pfizer o Moderna COVID-19 reciban una dosis de refuerzo después de cinco meses.

La recomendación actual para los refuerzos de COVID-19 es:

- Aquellos que recibieron la vacuna Moderna o Pfizer deben recibir un refuerzo **cinco meses** después de su última dosis.
- Aquellos que recibieron la vacuna de Johnson & Johnson deben recibir un refuerzo dos meses después de su dosis inicial.

Cualquier persona mayor de 12 años debe recibir un refuerzo. Se requiere el consentimiento de los padres para los niños de 12 a 17 años.

Los adultos pueden recibir cualquier marca de la vacuna COVID-19 como refuerzo, mientras que los niños de 12 a 17 años solo pueden recibir Pfizer. Los CDC recomiendan que las vacunas de ARNm fabricadas por Moderna y Pfizer sean la mejor opción para la mayoría de las personas para prevenir enfermedades graves y hospitalizaciones por COVID-19. Sin embargo, el NCDHHS y el Departamento de Salud Pública del Condado de Jackson alientan a las personas a hablar con un médico, enfermera o farmacéutico si tienen preguntas sobre qué refuerzo es adecuado para ellos.

Además, de acuerdo con la recomendación anterior de los CDC para adultos, los CDC recomiendan que los niños de 5 a 11 años con inmunodepresión moderada o grave reciban una dosis primaria adicional de la vacuna 28 días después de la segunda vacuna. Actualmente, solo la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 está autorizada y recomendada para niños de 5 a 11 años.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Jackson ofrece vacunas contra el COVID-19 (incluidas las dosis de refuerzo) los Martes, Jueves y Viernes. Para programar una cita, visite [vacunas.gov](https://www.vacunas.gov) o llame al 828-587-8289.

###